

# Sidabac BACVENTIVO

Oxitetraciclina, Bactericida  
Polvo Humectante/Sólido

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA % EN PESO

<ul style="list-style-type: none"> <li>OXITETRACICLINA: Clorhidrato de Oxitetraciclina con un contenido de oxitetraciclina base no menor de 83 %. No menos de: (Equivalente a 50 g de i.a. / Kg.)</li> </ul>	6.03 %
<b>OTROS INGREDIENTES:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nitrógeno (N). No menos de: (Equivalente a 50 g/Kg)</li> </ul>	5 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>Magnesio (Mg). No menos de: (Equivalente a 80 g/Kg)</li> </ul>	8 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>Azufre (S). No menos de: (Equivalente a 100 g/Kg)</li> </ul>	10 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>Salicilato de Potasio. No menos de: (Equivalente a 1 g/Kg)</li> </ul>	1000 ppm
<ul style="list-style-type: none"> <li>Acidos Fúlvicos. No menos de: (Equivalente a 2 g/Kg)</li> </ul>	2000 ppm

Número de registro: RSCO-FUNG-0330-316-002-006

## INFORMACIÓN GENERAL:

Sidabac es una formulación de Clorhidrato de Oxitetraciclina no estéril, que adecuadamente diluida puede ser usada como bactericida preventivo para controlar enfermedades como manchas y pecas bacterianas, Xanthomonas spp y algunos hongos como botrytis.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Kg/Ha	RECOMENDACIONES
Peral	Tizón (Erwinia amylovora)	220 a 500 g por cada 100 L de agua	Aplicar a los primeros síntomas o en el caso de una zona donde el año anterior se haya presentado la enfermedad, aplicar antes de la brotación. Repetir la aplicación tres veces con intervalos de 5 a 7 días
Tomate, chile, cucurbitáceas, frutales		40 a 100 g por cada 100 L de agua	

Distribuido por:



[www.growcare.mx](http://www.growcare.mx)  
[contacto@growcare.com.mx](mailto:contacto@growcare.com.mx)  
 4611044998